

Communications.

Description d'une nouvelle espèce
de *Chelidonium* Thoms. [COL. CERAMBYCIDAE]

par J. ACHARD.

Chelidonium Gahani, n. sp. — ♂. Tête vert brillant, allongée, ponctuée; occiput rugueux. Prothorax vert, un tant soit peu plus long que large, sillonné transversalement à la base et au sommet, ayant de chaque côté un tubercule obtus. Ponctuation rugueuse sur le disque, forte et confluyente dessous, plus faible et espacée sur les côtés. Disque orné sur sa partie antérieure d'une tache veloutée, transversale, dont les limites sont imprécises.

Écusson vert ou vert doré, large, à côtés curvilignes, déprimé longitudinalement en son milieu.




Fig. 1. — *Chelidonium Gahani* Achard; face intérieure de l'abdomen à partir du 4^e segment, à droite chez la ♀, à gauche chez le ♂.

Élytres verts, plus ou moins dorés sur leur première moitié, très rugueuses dans la région scutellaire et de moins en moins jusqu'au sommet. Sur chacune d'elles, deux bandes longitudinales vert foncé, veloutées; la première, partant de la base qu'elle recouvre entre l'écusson et le calus huméral, se dirige obliquement vers la suture, qu'elle atteint vers la moitié de

la longueur des élytres; elle se prolonge ensuite parallèlement à la suture en s'atténuant peu à peu, pour cesser d'être distincte vers le quart postérieur; la seconde, marginale, prend naissance sous l'épaule et s'atténue en arrière comme la première.

Dessous vert clair, brillant; poitrine et abdomen abondamment couverts de pubescence soyeuse, argentée, assez longue. Cinquième segment abdominal largement échancré; sixième marqué d'une fossette large, peu profonde, et de gros points espacés.

Antennes ne dépassant pas le sommet des élytres, leur premier article vert, les cinq derniers noirs, les intermédiaires violacés. Les articles 4-10 ont leur sommet aigu mais non épineux; le 11^e est légèrement appendiculé.

Pattes d'un bleu brillant, plus ou moins violacé ou verdâtre par places. Fémurs postérieurs dépassant notablement le sommet des élytres. Tibias postérieurs comprimés et sensiblement arqués. Tarses antérieurs et intermédiaires noirs, sensiblement égaux; postérieurs violacés, allongés, leur premier article au moins égal en longueur à tous les autres réunis.

♀. Antennes un peu plus courtes. Fémurs postérieurs ne dépassant que légèrement le sommet des élytres. Tibias postérieurs droits. Échancrure du 5^e segment abdominal occupant le $\frac{1}{3}$ au plus de la largeur du segment.

Hab. : Sumatra, Medan. — 1 ♂ et 1 ♀ de ma collection.

Le genre *Chelidonium*, qui avait été réuni par LACORDAIRE au genre *Leontium*, a été rétabli par C.-J. GAHAN⁽¹⁾ dans sa formule primitive, qui en fait une coupe intimement unie aux *Polyzonus*, tandis que les vrais *Leontium* sont proches parents des *Chloridolum*.

L'insecte ici décrit possède très exactement tous les caractères du genre, tels que les a exposés C.-J. GAHAN. Il y a seulement lieu de noter l'allongement sensible des pattes postérieures et du premier article de leurs tarses, et celui, beaucoup plus léger, de la tête et du prothorax. D'autre part, les derniers segments abdominaux, figurés ci-contre, ont une structure remarquable, et les antennes, même chez le mâle, ne dépassent pas le sommet des élytres.

Sur l'identité du *Julodis Kerimi* Fairm.

[COL. BUPRESTIDAE]

par L. BEDEL.

Parmi les erreurs notables de la synonymie des Buprestides, il en est une qui risquerait de s'accrediter, c'est la réunion du *Julodis Kerimi* Fairm. au *J. onopordi* Fabr.⁽²⁾.

On sait que les *Julodis* barbaresques se divisent en deux groupes :

Les uns, c'est-à-dire le *J. onopordi* Fabr. et toutes les formes qui s'y rattachent, ont l'épistome terminé par une forte échancrure.

(1) C.-J. GAHAN, Fauna of British India, Col. I, Cerambycidae, p. 211 [1906].

(2) Réunion proposée par ABEILLE in *Bol. Soc. esp. Hist. nat.* [1904], p. 210, et admise par THÉRY in *Bull. Soc. ent. Fr.* [1906], p. 127.